


# 膵がんレジメン一覧

化学療法名	更新日
<a href="#">GEM+NabPTX</a>	2020年8月14日
<a href="#">GEM</a>	2020年8月14日
<a href="#">S-1 + GEM</a> (膵がん)	2020年8月14日

# NabPTX+GEM

膵がん

【Day1・8・15】



薬剤	Day	1コース							2コース
		1		8		15		21	28
NabPTX	125mg/m <sup>2</sup>	●		●		●		休	●
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	●		●		●		休	●


1コース 4週

- ・ 中等度催吐レジメン (NabPTX :軽度 GEM :軽度)
- ・ 血管外漏出 (NabPTX :壊死性 GEM :炎症性)
- ・ NabPTXの蓄積性の末梢神経障害に注意
- ・ NabPTX投与1～2日後の筋肉痛に注意
- ・ GEM投与時の血管痛に注意 (軽減のため5%糖液で溶解)
- ・ GEMの投与時間が60分を超えると骨髄抑制が増強する可能性あり

# GEM単独

膀胱がん

【Day1・8・15】




薬剤	Day	1コース							2コース
		1		8		15		21	28
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	●		●		●		休	●

1コース 4週

- ・ 軽度催吐レジメン (GEM：軽度)
- ・ 血管外漏出 (GEM：炎症性)
- ・ GEM投与時の血管痛に注意
- ・ 投与時間が60分を超えると骨髄抑制が増強する可能性あり

# S-1+GEM

## 【Day1・8】



## 【Day1-14】

S-1内服：80mg/m<sup>2</sup>/日 分2

## 胆道系がん

薬剤	Day	1コース				2コース
		1	8	14	15	22
S-1	80mg/m <sup>2</sup> /日 分2 内服	●	→	→	休	●
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	●	●		休	●

## 1コース 3週

- ・ 中等度催吐レジメン (GEM：軽度 S-1：軽度)
- ・ 血管外漏出 (GEM：炎症性)
- ・ 催吐リスクは軽度の薬剤同士だが、中等度リスクに分類される。
- ・ GEM投与時の血管痛に注意
- ・ 投与時間が60分を超えると骨髄抑制が増強する可能性あり
- ・ S-1 腎機能による投与量の調節必要
- ・ S-1 vs ワーファリンでPT-INR延長の可能性
- ・ S-1による口内炎、下痢、骨髄抑制、手足症候群に注意。感染予防等の指導を確認

GEM：day1.8

S-1：80mg/m<sup>2</sup>/日分2 day1-14 3週間毎